3307	益田　吉仁	カキ	中谷早生、刀根早生

施肥　　**有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）**

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
奈良五條産直組合566	動物かす・魚粉類	(有)藤万	5	0	6		6		100	元肥	400	4月	1回	0.0	400	4/10～5/25	1回	0.0

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　**不使用**　割減

化学肥料	窒素使用量 (kg/10a)
慣行使用量	15
実績使用量	0

*節減対象農薬

当地比　**2**　割減

節減対象農薬	使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤		8
殺菌剤		7
その他薬剤		
合計	11	15

病虫害の防除　　**使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）**

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
殺菌	ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	中林商店	殺菌	600	300L	5月	1	1	600	300L	5/13～5/17	1	1	2	2
殺虫	トクチオン水和剤	プロチオホス	中林商店	殺虫	800	300L	5月	1	1	800	300L	5/1～5/4	1	1	2	2
殺虫	オリオン水和剤40	アラニカルブ	中林商店	殺虫	1000	300L	5月	1	1	1000	300L	5/13～5/17	1	1	1	1
殺菌	デランフロアブル	ジチアノン	中林商店	殺菌	2000	300L	5,6月	2	2	2000	300L	5/1～5/4,6/3～6/6	2	2	5	5
殺虫	モスピラン水溶剤	アセタミプリド	中林商店	殺虫	2000	300L	6月	1	1	2000	300L	6/3～6/6	1	1	3	3
殺菌	アミスター10フロアブル	アゾキシストロビン	中林商店	殺菌	1000	300L	7月	1	1	1000	300L	7/17～20	1	1	3	3
殺菌	ストロビードライフロアブル	クレソキシムメチル	中林商店	殺菌	3000	300L	8月	1	1	3000	300L	8/2～8/4	1	1	3	3
殺虫	キラップフロアブル	エチプロール	中林商店	殺虫	2000	300L	8月	1	1	2000	300L	8/2～8/4	1	1	2	2
殺菌	ベルクート水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	中林商店	殺菌	1000	300L	9月	1	1	1000	300L	9/3～9/6	1	1	3	3
殺虫	ダントツ水溶剤	クロチアニジン	中林商店	殺虫	2000	300L	9月	1	1	2000	300L	9/3～9/6	1	1	3	3

備考:

【品種:平核無の収穫について】
2022年シーズン終了後、スタッフが作業しやすいよう、だんだん畑であった圃地を整地する為、
平核無種の木の植え替えを行いました。
その影響で、2023年以降5年間は、平核無柿の収穫はできません。
代わりに中谷早生、刀根早生の2種が出荷されます。

収穫後、当日もしくは翌日中に渋抜きを開始します。
渋抜きには、炭酸ガスだけでなく、アルコールも使用します。
開始から約16時間後にガス抜きをし、
それから約1日置いて、出荷されます。

	計画（作業、施肥、防除など）	実績（作業）
1月	剪定	剪定
2月	剪定	剪定
3月	剪定	剪定
4月	施肥、防除	
5月	まびき、防除、草刈り	まびき、草刈り
6月	まびき、防除	まびき
7月	摘果、防除、草刈り	摘果、草刈り
8月	夏季選定、防除	夏季選定
9月	防除、収穫（中谷）9/9～25	収穫（中谷）9/9～
10月	収穫（刀根）9/20～10/25	
11月		
12月		

収穫開始:	令和6年9月9日
終了:	令和6年10月25日